

OneStep RT-qPCR Probe Mix 说明书

【产品简介】

OneStep RT-qPCR Probe Mix 由 Enzyme Mix 和 RT-qPCR Buffer 两部分组成。Enzyme Mix: 包含基因改造的 MMLV 反转录酶、抗体修饰的热启动 Taq DNA 聚合酶以及 RNase Inhibitor。RT-qPCR Buffer: 为专门针对 MMLV 和 Taq DNA 聚合酶优化的新型反应体系, 包含必要离子组分、dNTPs、PCR 稳定剂和增强剂, 确保反转录酶和聚合酶在同一个反应中发挥理想功效。该产品可在同一体系中完成 RNA 反转录和 PCR 扩增, 反应过程无需添加试剂、无需打开管盖, 既避免样品交叉污染, 又提高了检测灵敏度。

【产品组成】

产品名称	组成	KCH-P001
OneStep RT-qPCR Probe Mix	Enzyme Mix	500 μ L
	RT-qPCR Buffer	500 μ L

【使用方法】

1. 试剂准备: 取出全部的试剂, 轻盈混匀离心后使用。
2. 配制完成后, 涡旋混匀, 离心后分装。

组分	添加量	终浓度
RT-qPCR Buffer	5 μ L	1 $\times$
Enzyme Mix	5 μ L	1 $\times$
10 μ M 正向基因特异性引物	1.25 μ L	0.5 μ M
10 μ M 反向基因特异性引物	1.25 μ L	0.5 μ M
10 μ M 基因特异性探针	0.5 μ L	0.2 μ M
RNA 模板	按需求添加	
ddH ₂ O	加水至25 μ L	

备注: 基因特异性引物/探针和模板加样量可根据实际情况进行调整。

3. 按照下表设置 PCR 反应程序

反应程序				
步骤		温度	时间	循环
1	反转录	50 $^{\circ}$ C	10-30min	1
2	预变性	95 $^{\circ}$ C	1-5min	1
3	变性	95 $^{\circ}$ C	10~15sec	45
4	退火、延伸、荧光收集	58 $^{\circ}$ C	40~60sec	

4. 盖上反应管, 轻柔混匀, 可短暂离心, 确保反应液均在管底。
5. 将反应体系置于荧光定量 PCR 仪中, 开始反应。
6. 实验结果分析。

【储存条件】

该试剂可在-30 ~ -15 $^{\circ}$ C下保存 1 年, $\leq 0^{\circ}$ C运输。

【联系信息】



上海科驰皓生物科技有限公司
Shanghai Scichiho Biotech Co., Ltd.
地址：上海浦东新区宣秋路 139 号 1 号楼 621 室
网址：<https://www.scichiho.com>